(1) Consider the set $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

(a) Draw set A , its boundary and interior set. Discuss whether A is open, closed, bounded, compact and/or convex. Clearly explain your answer.

(b) Consider the function

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 + (y-1)^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 1), \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 1). \end{cases}$$

Determine if this function achieves a maximum in A . Does it achieve a minimum?

Solución:

(a) El conjunto $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, \}$ es un disco de radio $\sqrt{2}$ y centro $(0, 0)$. El conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2\}$ es una parábola. Además $A = B \cap C$. Gráficamente,

La frontera y el interior están representados en la figura siguiente

Como $\partial(A) \subset A$, el conjunto A es cerrado. El conjunto es acotado, ya que esta contenido en $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, \}$ el disco de radio $\sqrt{2}$ y centro $(0, 0)$. Los conjuntos B y C son convexos. Por lo tanto, $A = B \cap C$ también es convexo.

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y) = \infty$ y $(0, 1) \in A$. Por lo tanto, $f(x, y)$ no puede alcanzar un máximo absoluto en A . Por otra parte, observamos que $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in A$ y que $f(0, 1) = 0$. Por lo tanto, el punto $(0, 1)$ es un mínimo global de f en A .

(2) Consider the following system of equations

$$\begin{cases} y^2 + z^2 - x^2 = -4 \\ e^{y-1} + x - z^2 = 0 \end{cases}$$

- (a) Show that the above system of equations determines y and z as differentiable functions of x in a neighborhood of the point $(3, 1, 2)$.
- (b) Let $y(x), z(x)$ be the functions found in part (a). Compute the derivatives $y'(3)$ y $z'(3)$.
-

Solución:

- (a) Consideremos las funciones

$$\begin{aligned} f_1 &= y^2 + z^2 - x^2 + 4 \\ f_2 &= e^{y-1} + x - z^2 \end{aligned}$$

Estas funciones son de clase C^1 . Además se comprueba fácilmente que el punto $(3, 1, 2)$ es una solución del sistema

$$f_1(3, 1, 2) = f_2(3, 1, 2) = 0$$

Ahora comprobamos que

$$\frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y, z)}(3, 1, 2) = \det \begin{pmatrix} 2y & 2z \\ e^{y-1} & -2z \end{pmatrix} \Big|_{x=3, y=1, z=2} = \det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = -12 \neq 0$$

Por lo que se verifican las hipótesis del Teorema de la Función implícita.

- (b) Derivamos el sistema respecto a x

$$\begin{cases} 2yy' + 2zz' - 2x = 0 \\ y'e^{y-1} + 1 - 2zz' = 0 \end{cases}$$

Ahora sustituimos $x = 3, y = 1, z = 2$ con lo que obtenemos

$$\begin{cases} 2y'(3) + 4z'(3) - 6 = 0 \\ y'(3) + 1 - 4z'(3) = 0 \end{cases}$$

de donde obtenemos

$$y'(3) = \frac{5}{3}, \quad z'(3) = \frac{2}{3}$$

(3) Consider the function

$$f(x, y) = x^2 - y^2 - 2xy - x^3$$

- (a) Determine the greatest open and convex set S of $\mathbb{R}^2$ where the function f is concave.
(b) Determine whether f achieves global extrema over the set S that you identified in the answer to the previous question.
-

Solución:

- (a) El gradiente de f es

$$\nabla f = (2x - 2y - 3x^2, -2y - 2x)$$

La matriz Hessiana de f es

$$Hf = \begin{pmatrix} 2 - 6x & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

f es cóncava para los valores de x e y que hacen el hessiano definido negativo o semidefinido negativo. Para determinar esto último calculamos sus menores,

$$D_1 = 2 - 6x, \quad D_2 = 12x - 8$$

Luego f es cóncava si y sólo si $D_1 < 0$ y $D_2 > 0$, es decir, si y sólo si $x > 1/3$ y $x > 8/12 = 2/3$. Como $2/3 > 1/3$, es suficiente la segunda solución. Así, f es cóncava en el conjunto

$$S = \{(x, y) : x > 2/3\}$$

- (b) La función f es diferenciable. Los puntos críticos de f son las soluciones de $\nabla f = (0, 0)$, o equivalentemente

$$\begin{aligned} 2x - 2y - 3x^2 &= 0 \\ -x - y &= 0 \end{aligned}$$

cuyas soluciones son

$$(x, y) = (0, 0), \quad (x, y) = (4/3, -4/3)$$

El punto $(0, 0)$ no está en S . El punto $(4/3, -4/3)$ sí está en S . Este conjunto es convexo y f es cóncava en S . Por lo tanto, $(4/3, -4/3)$ es un máximo global de f en S . No hay mínimo, ni local ni global, en S .

(4) Consider the function

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy$$

and the set

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 2\}$$

- (a) Write the Lagrange's equations that are needed to identify the extrema of f on A .
(b) Determine the global extrema of f on A , and clearly argue whether they are a minimum or a maximum.
-

Solución:

- (a) El Lagrangiano es

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 2xy - \lambda(x^2 + y^2 - 2)$$

por lo que las ecuaciones de Lagrange son

$$2x - 2y - 2x\lambda = 0$$

$$2y - 2x - 2y\lambda = 0$$

$$x^2 + y^2 = 2$$

- (b) En primer lugar simplificamos las ecuaciones a

$$(1 - \lambda)x = y$$

$$(1 - \lambda)y = x$$

$$x^2 + y^2 = 2$$

De las dos primeras ecuaciones vemos que

$$(1 - \lambda)^2 y = y$$

Pero $y = 0$ no puede ser solución porque si sustituimos $y = 0$ en la segunda ecuación se obtiene que $x = 0$ y estos valores no verifican la tercera ecuación. Concluimos que $(1 - \lambda)^2 = 1$ por lo que los valores posibles de λ son 0 y 2. Si $\lambda = 0$, obtenemos las soluciones $(1, 1), (-1, -1)$. Si $\lambda = 2$, obtenemos las soluciones $(1, -1), (-1, 1)$.

La matriz Hessiana de L es

$$HL(x, y; \lambda) \begin{pmatrix} 2 - 2\lambda & -2 \\ -2 & 2 - 2\lambda \end{pmatrix}$$

Vemos que

$$HL((x, y; 0) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \quad HL((x, y; 2) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

En ningún caso es definida por lo que las condiciones de segundo orden no son informativas. En los puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$ tenemos que

$$\nabla(x^2 + y^2 - 2)|_{x=y=1} = (2x, 2y)|_{x=y=1} = (2, 2), \quad \nabla(x^2 + y^2 - 2)|_{x=y=-1} = (2x, 2y)|_{x=y=-1} = -(2, 2)$$

por lo que

$$T_{(1,1)}M = T_{(-1,-1)} = \{(v_1, v_2) = (2, 2) \cdot (v_1, v_2) = 0\} = \{(t, -t) = t \in \mathbb{R}\}$$

Obtenemos la forma cuadrática

$$(t, -t) \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -t \\ -t \end{pmatrix} = 8t^2$$

que es definida positiva, por lo que los puntos $(1, 1), (-1, -1)$ son mínimos globales.

En los puntos $(-1, 1)$ y $(1, -1)$ tenemos que

$$T_{(-1,1)}M = T_{(1,-1)} = \{(v_1, v_2) = (-2, 2) \cdot (v_1, v_2) = 0\} = \{(t, t) = t \in \mathbb{R}\}$$

Obtenemos la forma cuadrática

$$(t, -t) \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -t \\ -t \end{pmatrix} = -8t^2$$

que es definida negativa, por lo que los puntos $(-1, 1), (1, -1)$ son máximos globales.

Una manera alternativa de clasificar los puntos críticos es la siguiente. El conjunto A es compacto y la función f es continua. Por el Teorema de Weierstrass, f alcanzan un máximo y un mínimo globales en A . Estos puntos extremos deben de satisfacer las ecuaciones de Lagrange. Calculando el valor de f en estos puntos vemos que

$$f(1, 1) = f(-1, -1) = 0, \quad f(-1, 1) = f(1, -1) = 4$$

por lo que en los puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$ se alcanza un mínimo global y en los puntos $(-1, 1)$ y $(1, -1)$ se alcanza un máximo global.

(5) Consider the following maximization problem

$$\begin{aligned} \max_{x,y} \quad & x^2 + y^2 + y - 1 \\ \text{s.a.} \quad & x^2 + y^2 \leq 1 \end{aligned}$$

- (a) Write the Kuhn-Tucker's equations that are needed to identify the extrema of f on A .
(b) Determine the feasible points that satisfy the Kuhn-Tucker's equations.
-

Solución:

- (a) La función $x^2 + y^2 + y - 1$ es continua y el conjunto $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ es compacto. Por el Teorema de Weierstrass existe un máximo y un mínimo global. Las funciones $x^2 + y^2 + y - 1$ y $x^2 + y^2 - 1$ son de clase C^∞ y se verifica la condición de regularidad. El Lagrangiano del problema es

$$L = x^2 + y^2 + y - 1 + \lambda(1 - x^2 - y^2)$$

y las ecuaciones de Kuhn-Tucker son

$$(1) \quad \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2\lambda x = 0$$

$$(2) \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 1 - 2\lambda y = 0$$

$$(3) \quad \lambda(x^2 + y^2 - 1) = 0$$

$$(4) \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

$$(5) \quad \lambda \geq 0$$

- (b) Si $\lambda = 0$, entonces $x = 0$ (por la ecuación 1), $y = -1/2$ (por la ecuación 2). Obtenemos la solución

$$x = 0, y = -1/2, \quad \lambda = 0$$

Si $\lambda \neq 0$, entonces $x^2 + y^2 - 1 = 0$. La ecuación 1 se puede escribir como $x(1 - \lambda) = 0$. Si $x = 0$ entonces $y = \pm 1$. Si $y = 1$, de la ecuación 2 vemos que $\lambda = 3/2$ y obtenemos la solución

$$x = 0, y = 1, \quad \lambda = \frac{3}{2}$$

Si $y = -1$, de la ecuación 2 vemos que $\lambda = 1/2$ y obtenemos la solución

$$x = 0, y = -1, \quad \lambda = \frac{1}{2}$$

Finalmente, si $\lambda = 1$, de la ecuación 2 obtenemos que $2y + 1 - 2y = 0$, lo cual es imposible. Concluimos que las soluciones de las ecuaciones de Kuhn-Tucker son los puntos

$$x = 0, y = -1/2, \quad \lambda = 0$$

$$x = 0, y = 1, \quad \lambda = \frac{3}{2}$$

$$x = 0, y = -1, \quad \lambda = \frac{1}{2}$$

Como

$$f(0, -1/2) = \frac{-5}{4}, \quad f(0, 1) = 1, \quad f(0, -1) = -1$$

el mínimo global se alcanza en el punto $(0, -1/2)$ y el máximo global se alcanza en el punto $(0, 1)$.