Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Economía
Examen final de Matemáticas II. 29 de Junio de 2021.

Apellidos:		Nombre:
DNI:	Titulación:	Grupo:

IMPORTANTE

- **DURACIÓN DEL EXAMEN: 2h**
- **NO** se permite el uso de calculadoras.
- **Sólo se entregará este cuadernillo.** Las respuestas deben escribirse en este cuadernillo ya que sólo se puntuará lo que haya en él. Por favor, compruebe que hay 10 páginas en el cuadernillo.
- **NO DESGRAPE LAS HOJAS DEL EXAMEN.**
- Es imprescindible identificarse ante el profesor.
- Hay espacio adicional para operaciones al final del examen y detrás de esta página.

Problema	Puntuación
1	
2	
3	
4	
5	
Total	

(1) Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales,

$$\begin{cases} bx + y + z = a \\ x + y + 2z = b \\ 2x + y + z = a \end{cases}$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ son parámetros.

(a) Clasifique el sistema según los valores de a y b . 10 puntos

Solution: La matriz asociada al sistema es

$$\begin{pmatrix} b & 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 2 & b \\ 2 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

Reordenando las filas, obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & b \\ b & 1 & 1 & a \\ 2 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

Ahora, realizamos las siguientes operaciones elementales

$$\text{fila } 2 \mapsto \text{fila } 2 - b \times \text{fila } 1$$

$$\text{fila } 3 \mapsto \text{fila } 3 - 2 \times \text{fila } 1$$

para obtener un sistema de ecuaciones equivalente al sistema inicial, dado por la matriz ampliada siguiente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & b \\ 0 & 1-b & 1-2b & a-b^2 \\ 0 & -1 & -3 & a-2b \end{pmatrix}$$

Intercambiamos las filas 2 y 3,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & b \\ 0 & -1 & -3 & a-2b \\ 0 & 1-b & 1-2b & a-b^2 \end{pmatrix}$$

Finalmente, realizamos la operación elemental $\text{fila } 3 \mapsto \text{fila } 3 + (1-b) \times \text{fila } 2$ para obtener,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & b \\ 0 & -1 & -3 & a-2b \\ 0 & 0 & b-2 & -(a-b)(b-2) \end{pmatrix}$$

Podemos ver que,

(i) si $b \neq 2$, tenemos $\text{rank } A = \text{rank}(A|b) = 3$. Para cualquier valor de $a \in \mathbb{R}$, el sistema es compatible determinado con una única solución.

(ii) si $b = 2$, la matriz ampliada del sistema es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se cumple, $\text{rank } A = \text{rank}(A|b) = 2 < \text{número de incógnitas}$. Para cualquier valor de $a \in \mathbb{R}$, el sistema es compatible indeterminado con infinitas soluciones que dependen de un parámetro.

(b) Resuelva el sistema anterior cuando $b = 2$.

10 puntos

Solution: En este caso tenemos que el sistema lineal de ecuaciones propuesto es equivalente al siguiente sistema,

$$\begin{cases} x + y + 2z = 2 \\ -y - 3z = a - 4 \end{cases}$$

La solución es

$$z \in \mathbb{R}, \quad x = a + z - 2, \quad y = 4 - a - 3z$$

(2) Dado el conjunto

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 6 - 6x \leq y \leq 6 - x^2 + 5x, y \geq 0\}$$

y la función

$$f(x, y) = (y + 2x)^3$$

- (a) Represente el conjunto A , su frontera y su interior y justifique si el conjunto es abierto, cerrado, acotado, compacto o convexo. **10 puntos**

Solution: *El conjunto A se representa aproximadamente como la figura (azul) en la siguiente imagen.*

Su interior, clausura y frontera son:

El conjunto A es cerrado al cumplir $\partial A \subset A$. No es abierto porque $A \cap \partial A \neq \emptyset$. Es acotado y por lo tanto el conjunto A es compacto. También es un conjunto convexo al ser el conjunto A la intersección de tres conjuntos convexos: $A = B \cap C \cap D$ con

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 6 - 6x\}$$

y

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 6 + 5x - x^2\}$$

La función $g(x) = 6 + 5x - x^2$ es una función cóncava y por lo tanto D es un conjunto convexo. Los conjuntos B y C son dos semiplanos cerrados y por lo tanto también son conjuntos convexos. (La intersección de conjuntos convexos es un conjunto convexo)

- (b) Enuncie el Teorema de Weierstrass. Determine si es posible aplicar el Teorema de Weierstrass a la función f definida en el conjunto A . Utilizando las curvas de nivel, determine (si existen) los puntos extremos globales de f en el conjunto A . **10 puntos**

Solution: El conjunto A es compacto. La función $f(x, y) = (y + 2x)^3$ es continua en todo su dominio de definición $D(f) = \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, se cumple el teorema de Weierstrass y sabemos que la función f alcanza un máximo y un mínimo valor sobre el conjunto A . Las curvas de nivel de la función f vienen dadas por la ecuación $y + 2x = c$, $c > 0$, y por lo tanto son líneas rectas paralelas de la forma $y = c - 2x$ con $c \in \mathbb{R}$. En la figura representamos las curvas de nivel en color rojo. La flecha nos indica la dirección de crecimiento de la función f .

Graficamente, podemos observar que el mínimo valor de la función se alcanza en el punto $(1, 0)$. El máximo se alcanza en el punto (a, b) perteneciente a la gráfica de la función $h(x) = 6 - x^2 + 5x$ donde la recta tangente tiene como pendiente el valor -2 . Como $h'(x) = -2x + 5$, se tiene que cumplir $-2a + 5 = -2$. Y por lo tanto, $a = 7/2$, $b = h(7/2) = 45/4$.

(3) Considere la función $f(x, y) = c^2y^3 - 6cxy + 3x^2$ con $c \in \mathbb{R}$, $c \neq 0$.

(a) Determine los puntos críticos (si existen) de la función f en el conjunto $\mathbb{R}^2$. 10 puntos

Solution: El gradiente de f es

$$(6x - 6cy, 3c^2y^2 - 6cx)$$

Los puntos críticos están determinados por las siguientes ecuaciones

$$0 = 6x - 6cy$$

$$0 = 3c^2y^2 - 6cx$$

Como, $c \neq 0$, los puntos críticos son $(0, 0)$, $(2c, 2)$.

(b) Clasifique los puntos críticos encontrados anteriormente en máximos, mínimos (locales o globales) y/o puntos de silla. 10 puntos

Solution: La matriz Hessiana es

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6 & -6c \\ -6c & 6c^2y \end{pmatrix}$$

Evaluando en los puntos críticos vemos que

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 6 & -6c \\ -6c & 0 \end{pmatrix}$$

Como, $\det(H(0, 0)) = -36c^2 < 0$, el punto crítico $(0, 0)$ es un punto de silla. Por otro lado,

$$H(2c, 2) = \begin{pmatrix} 6 & -6c \\ -6c & 12c^2 \end{pmatrix}$$

Y observamos que $D_1 = 6 > 0$ y $D_2 = 36c^2 > 0$. Por lo tanto concluimos que el punto $(2c, 2)$ es un mínimo local.

Además, $f(0, y) = c^2y^3$ y podemos comprobar que $\lim_{y \rightarrow \infty} f(0, y) = +\infty$, $\lim_{y \rightarrow -\infty} f(0, y) = -\infty$ y por lo tanto sabemos que no existe ni máximo ni mínimo global.

(4) Considere la ecuación $4xy + 2xz + z^4 = 13$.

- (a) Demuestre que la ecuación anterior define de manera implícita a una función diferenciable $z(x, y)$ cerca del punto $(2, 1, 1)$. **10 puntos**

Solution: Sea $f(x, y, z) = 4xy + 2xz + z^4 = 13$. Como,

$$\frac{\partial f}{\partial z}(2, 1, 1) = 2x + 4z^3 \Big|_{x=2, y=1, z=1} = 8$$

por el teorema de la función implícita, la ecuación $4xy + 2xz + z^4 = 13$ define a z como una función diferenciable de variables independientes x e y , en un vecindario del punto $(2, 1)$.

- (b) Calcule el polinomio de Taylor de orden 1 de la función $z(x, y)$ (del apartado anterior) en el punto $(2, 1)$. **10 puntos**

Solution: Derivando implícitamente la ecuación $4xy + 2xz + z^4 = 13$ con respecto a las variables x e y obtenemos

$$4 \frac{\partial z}{\partial x} z^3 + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + 2z + 4y = 0$$

$$4 \frac{\partial z}{\partial y} z(2, 1)^3 + 4 \frac{\partial z}{\partial y} + 8 = 0$$

sustituyendo ahora en el punto $x = 2, y = 1, z(2, 1) = 1$ obtenemos las ecuaciones

$$8 \frac{\partial z}{\partial x}(2, 1) + 6 = 0$$

$$8 \frac{\partial z}{\partial y}(2, 1) + 8 = 0$$

por lo que obtenemos

$$\frac{\partial z}{\partial x}(2, 1) = -\frac{3}{4}, \quad \frac{\partial z}{\partial y}(2, 1) = -1$$

Por lo tanto, el polinomio de Taylor de orden 1 de la función $z(x, y)$ en el punto $(2, 1)$ es

$$P_1(x, y) = 1 - \frac{3}{4}(x - 2) - (y - 1) = \frac{7}{2} - \frac{3x}{4} - y$$

(5) Considere los puntos extremos de la función

$$f(x, y) = 4x^2 + 4xy + y^2$$

en el conjunto

$$S = \{(x, y) : x^2y = 4\}$$

(a) Escribe la función Lagrangiana, las ecuaciones de Lagrange y calcule sus soluciones. 10 puntos

Solution: La función Lagrangiana es

$$\mathcal{L}(x, y) = 4x^2 + 4xy + y^2 - \lambda(x^2y - 4)$$

Y las ecuaciones de Lagrange son

$$\begin{aligned}8x + 4y - 2\lambda xy &= 0 \\4x + 2y - \lambda x^2 &= 0 \\x^2y &= 4\end{aligned}$$

Observe que $x = 0$ no es parte de la solución. Si asumimos que se cumple $x \neq 0$. Las ecuaciones anteriores se pueden reescribir como

$$\begin{aligned}8x + \frac{16}{x^2} - \frac{8\lambda}{x^2} &= 0 \\4x + \frac{8}{x^2} - \lambda x^2 &= 0 \\y &= \frac{4}{x^2}\end{aligned}$$

Esto es

$$\begin{aligned}8x^3 + 16 - 8\lambda x &= 0 \\4x^3 + 8 - \lambda x^4 &= 0 \\y &= \frac{4}{x^2}\end{aligned}$$

Dividiendo la primera ecuación por 2 obtenemos

$$\begin{aligned}4x^3 + 8 - 4\lambda x &= 0 \\4x^3 + 8 - \lambda x^4 &= 0 \\y &= \frac{4}{x^2}\end{aligned}$$

Por lo tanto, $4\lambda x = \lambda x^4$. Una solución es

$$x = -2^{1/3}, \quad y = 2 \times 2^{1/3}, \quad \lambda = 0$$

Por otro lado, obtenemos $4 = x^3$. Así,

$$x = 4^{1/3}, \quad y = 4^{1/3}, \quad \lambda = 3 \times 2^{1/3}$$

observe que

$$f\left(-2^{1/3}, 2 \times 2^{1/3}\right) = 0, \quad f\left(4^{1/3}, 4^{1/3}\right) = 18 \times 2^{1/3}$$

(b) ¿Se cumplen las hipótesis del Teorema de Weierstrass? Determine si alguna de las soluciones de las ecuaciones de Lagrange se corresponde a un máximo o mínimo global. 10 puntos

Solution: El conjunto S no es compacto. Por lo tanto el Teorema de Weierstrass no se puede aplicar. Por otro lado, tenemos que $f(x, y) = 4x^2 + 4xy + y^2 = (2x + y)^2 \geq 0$. Por lo tanto, el punto $(-2^{1/3}, 2 \times 2^{1/3})$ se corresponde con un mínimo global. Además, tomando $y = 4/x^2$ obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(x, \frac{4}{x^2}\right) = \infty$$

por lo que no existe máximo global.