

January 23, 2019

**MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA II (2018-19)**  
*ECONOMÍA, DERECHO-ECONOMÍA, ESTUDIOS INTERNACIONALES-ECONOMÍA*

**HOJA 1. MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS**

- (1) Calcular los siguientes determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & -4 \end{vmatrix}$$

(2) Si  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ u & v & w \end{vmatrix} = 25$ , calcúlese razonadamente el valor de  $\begin{vmatrix} 2a & 2c & 2b \\ 2u & 2w & 2v \\ 2p & 2r & 2q \end{vmatrix}$ .

- (3) Comprueba las siguientes identidades sin desarrollar los determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bc & a & a^2 \\ ca & b & b^2 \\ ab & c & c^2 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & c+a \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix} = 0$$

- (4) Resolver la ecuación sin desarrollar el determinante, utilizando las propiedades de los determinantes:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & x & c \\ a & b & x \end{vmatrix} = 0$$

(5) Calcula, simplificando previamente: a)  $\begin{vmatrix} ab & 2b^2 & -bc \\ a^2c & 3abc & 0 \\ 2ac & 5bc & 2c^2 \end{vmatrix}$  b)  $\begin{vmatrix} x & x & x & x \\ x & a & a & a \\ x & a & b & b \\ x & a & b & c \end{vmatrix}$  c)  $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

- (6) Sea  $A$  una matriz cuadrada tal que  $A^t A = I$ . Demuestra que  $|A| = \pm 1$ .

- (7) Hallar el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- (8) Estudia, según los valores de  $x$  el rango de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} x & 0 & x^2 & 1 \\ 1 & x^2 & x^3 & x \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} x & -1 & 0 & 1 \\ 0 & x & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- (9) Suponiendo que  $A$  y  $B$  son matrices regulares ( $\det \neq 0$ ), y que hay conformidad de órdenes para poder realizar las operaciones, despeja la matriz  $X$  en las expresiones siguientes:

(a)  $X^t \cdot A = B$

(b)  $(X \cdot A)^{-1} = A^{-1} \cdot B$

Calcula la matriz  $X$  en las ecuaciones anteriores si  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  y  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- (10) Calcula, siempre que sea posible, la inversa de las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ -x & 1 & -\frac{x^2}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & x & 3 \\ 4 & 1 & -x \end{pmatrix}$$

- (11) Calcula, siempre que sea posible, la inversa de las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (12) Dado el sistema  $\begin{cases} mx - y = 1 \\ x - my = 2m - 1 \end{cases}$  se pide calcular  $m$  para que el sistema
- no tenga solución,
  - tenga infinitas soluciones,
  - tenga solución única
  - tenga una solución para la que  $x = 3$ .

- (13) Dado el sistema de ecuaciones lineales  $\begin{cases} x + ay = 1 \\ ax + z = 1 \\ ay + z = 2 \end{cases}$  se pide

- Expresarlo en forma matricial y escribir el vector de incógnitas, el del término independiente y el sistema homogéneo asociado.
- Discutir y resolver según los valores de  $a$ .

- (14) Discutir y resolver el sistema siguiente  $\begin{cases} x + y + z + 2t - w = 1 \\ -x - 2y + 2w = -2 \\ x + 2z + 4t = 0 \end{cases}$

- (15) Discutir y resolver el sistema siguiente, según los valores de los parámetros:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ ax + y + z = b \\ 2x + 2y + (a + 1)z = 0 \end{cases}$$

- (16) Discutir y resolver el sistema siguiente, según los valores de los parámetros:

$$\begin{cases} x - 2y + bz = 3 \\ 5x + 2y = 1 \\ ax + z = 2 \end{cases}$$

- (17) Resolver mediante el método de Cramer el sistema siguiente,

$$\begin{cases} -x + y + z = 3 \\ x - y + z = 7 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

- (18) Resolver mediante el método de Cramer el sistema siguiente,

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ y + z = 8 \\ x + z = 6 \end{cases}$$

- (19) Resolver mediante el método de Cramer el sistema siguiente,

$$\begin{cases} x + y - 2z = 9 \\ 2x - y + 4z = 4 \\ 2x - y + 6z = -1 \end{cases}$$

- (20) Dado el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas siguiente,

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ ax + (a + 3)y + 3z = 1 \end{cases}$$

- (a) Estudiar si para algún valor de  $a$  el sistema es incompatible.
- (b) Para cada valor del parámetro  $a$ , para el que el sistema sea compatible, escribir la expresión general de todas sus soluciones.

(21) Dado el sistema homogéneo

$$\begin{cases} 3x + 3y - z = 0 \\ -4x - 2y + mz = 0 \\ 3x + 4y + 6z = 0 \end{cases}$$

- (a) Calcular  $m$  para que tenga alguna solución distinta a la trivial.
- (b) resolverlo para el valor calculado en el apartado anterior.